

Epidemiologia delle co- occorrenze psicopatologiche nei disturbi del neurosviluppo

Gianluigi Mansi
Medico psichiatra
IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (Lc)
Unità di Psichiatria ICZ Monza-Carate Brianza

Comorbidità psicopatologiche

Molto frequenti

Tassi di prevalenza molto
variabili

Valori di comorbidità

○ DISABILITA' INTELLETTIVA

- 3-4 volte superiore alla popolazione generale
- esordi più precoci;
- 25-44% 1 dist.; 21 % 2; 8% 3.
- Spetto autistico; disturbi umore; ansia.
- Specificità: Down → Alzheimer; velocardiofacciale → psicosi.

○ SPETTRO AUTISTICO:

- 70 – 80 %.
- Bambino: Ansia, adhd, dist. oppositivo provocatorio.
Adulto: umore, ansia, adhd

Si correlano ?

- Modello bio-psico-sociale
- Sinaptopatie

Comorbidity: un concetto eterogeneo

- Concorrente (co-presenza)/successiva
- Omotipico/eterotipico
- Comorbidity in famiglia
- Comorbidity fisiche: autismo adulto → obesità, ipertensione, epilessia, diabete.
- Comorbidity nascosta.

Definizione di comorbidità

- Co-occorrenza di condizioni patologiche con frequenza maggiore rispetto ad aspettativa casuale.
- Concomitanza di due o più disturbi che determinano una forma clinica qualitativamente distinta e con caratteristiche individuali di trattamento

Problemi diagnostici

- Atipia
- Quadro attenuato (monosintomatico)
- Sottosoglia
- Forma mascherata

- Ruolo dei disturbi del neurosviluppo come fattori di resistenza alle terapie

Take home message

- Continuità disturbi infantili → adulti
- Rischi della suddivisione NPI/PSY
- Vulnerabilità
- Comorbidità → multimorbidità → complessità clinica
- Ma dove vanno a finire i disturbi del neurosviluppo in età adulta?

Linee guida multimorbilità

- National Institute for Health and Care Excellence.
- **Multimorbidity: clinical assessment and management.**
- September 2016.
- www.nice.org.uk/guidance/ng56



mansi@tin.it